

**REALIZUOJAMŲ MIŠKO SODMENŲ MINIMALŪS MATMENYS. TUOPOS, DREBULĖS
IR DIRBTINIŲ JŲ RŪŠIŲ HIBRIDŲ, IŠAUGINTŲ IŠ ŪGLIŲ, ŠAKNŲ ATKARPŲ IR
ATŽALŲ, KOKYBĖS REIKALAVIMAI**

Realizuojamų miško sodmenų mažiausi matmenys:

1 lentelė

Eil. Nr.	Medžių rūšies arba genties pavadinimas	Amžius, m.	Minimalūs matmenys	
			antžeminės dalies aukštis, cm	šaknies kaklelio storis, mm
1	2	3	4	5
Spygliuočiai				
1.	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i> L.	1	6	2
		2	10	3
		3	20	5
		1+1	8	3,5
		1+2; 2+1	15	5
		1K	8	2
		2K	10	3
		1K+1	15	3
2.	Paprastoji eglė <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	2	14	2,5
		3	24	4
		1+1; 1+2; 2+1; 1,5+1,5	20	4
		1,5+2,5; 2+2	25	5
		2+3	40	6
		1K	14	2,5
		2K; 1K+1	20	4
		1K+2	25	4,5
3.	Maumedis <i>Larix</i> sp.	1	10	2,5
		1+1; 2	20	4
		1+2	35	5
		1K	10	2,5
		1K+1; 2K	20	4
4.	Kalninė pušis <i>Pinus mugo</i> Turra	2	8	2,5
		2+1; 1+2	15	3,5
		2+2	20	4
		1K	6	2
		1K+1; 2K	10	3
Lapuočiai				
5.	Paprastasis ąžuolas <i>Quercus robur</i> L.	1	15	4
		2	25	5
		3	40	5
		4	60	7
		1+2; 2+1	40	5
		1+3; 2+2	50	6
		2+3; 3+2	70	9

		1K	20	4
		2K	30	5
6.	Bekotis ažuolas <i>Quercus petraea</i> Liebl.	1	15	4
		2	30	5
		1+2; 2+1	45	6
		2+2	60	8
7.	Paprastasis bukas <i>Fagus sylvatica</i> L.	1	10	3
		2; 1+1	25	4
	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i> L.	1+2; 2+1	35	5
		1+3; 2+2	45	6
		1K	10	3
		2K	20	4
8.	Beržas <i>Betula</i> sp.	1	15	2
		2; 1+1; 1,5	30	3
		1K	10	2
		2K; 1K+1.	30	3
9.	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i> L.	1	10	3
		2	35	6
		1+1	30	6
		1+2; 2+1	50	9
		1K	10	3
		2K; 1K+1	30	5
10.	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i> L.	1	10	3
		2	40	6
		1+1	25	5,5
		1+2; 2+1	60	8
		1K	10	3
		2K; 1K+1	35	6
11.	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	1	15	3
		2; 1+1	40	7
		1K	10	3
		2K; 1K+1	30	5
12.	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i> Mill.	1	10	3
		2	30	4
		1+1	30	5
		1+2; 2+1	50	7
		1K	10	3
		2K; 1K+1	30	4
13.	Kalninė guoba <i>Ulmus glabra</i> Huds.	1	10	3
		2	30	5
		3	60	8
		1+1	30	7
		1+2; 2+1	50	6
14.	Paprastasis skirpstas <i>Ulmus carpiniifolia</i> Gleditsch.	1	10	3
		1+1	25	5
	Paprastoji vinkšna <i>Ulmus laevis</i> Pall.	1+2	45	6
15.	Drebulė <i>Populus tremula</i> L.	1	20	4
		1+1	50	8
		1K	20	4
		2K; 1K+1	50	8

Pastaba. Simboliai ir žymėjimai:

+ – persodinti sodmenys;

1 – vienmečiai sėjinukai;

1+0 – vienmečiai sodinukai (sėjinukai, persodinti pasibaigus pirmajam vegetacijos periodui);

1+1 – dvimečiai sodinukai (sėjinukai, persodinti pasibaigus pirmajam vegetacijos periodui ir auginti vieną vegetacijos periodą po persodinimo);

1,5+0,5 – dvimečiai sodinukai (sėjinukai, persodinti antrojo vegetacijos periodo metu (vasarą) ir auginti iki šio vegetacijos periodo pabaigos);

1K – vienmečiai sėjinukai, išauginti konteineriuose;

1K+1 – dvimečiai sodinukai (vienerius metus konteineriuose auginti sėjinukai, persodinti į atvirą gruntą ir auginti vieną vegetacijos sezoną);

0+1 – vienmečiai sodinukai, išauginti iš sodmeninių augalo dalių.

Tuopos, drebulės (*Populus spp.*) ir dirbtinių jų rūšių hibridų dauginamosios medžiagos, išaugintos iš ūglių, šaknų atkarpų ir atžalų, kokybės reikalavimai

1. Stiebo ūgliai laikomi nekokybiškais, jeigu:

1.1. ūglių medienos amžius didesnis kaip dveji metai;

1.2. jie turi mažiau kaip du susiformavusius pumpurus;

1.3. pažeisti nekrozės arba žalingų organizmų;

1.4. apdžiūvę, sušutę, suplėkę arba apipuvę.

2. Mažiausi ūglių matmenys:

2.1. mažiausias ilgis – 20 cm,

2.2. mažiausias viršūnės skersmuo: 1EC klasė – 8 mm, 2EC klasė – 10 mm.

3. Atžalos laikomos nekokybiškomis, jeigu:

3.1. jų medienos amžius didesnis kaip dveji metai;

3.2. turi mažiau kaip penkis susiformavusius pumpurus;

3.3. pažeistos nekrozės arba žalingų organizmų;

3.4. apdžiūvusios, sušutusias, suplėkusios arba apipuvusios;

3.5. žaizdotos ir žaizdos atsiradusios ne genėjant;

3.6. daugiastiebės;

3.7. stiebas pernelyg išlinkęs.

4. Atžalų dydžio klasės:

2 lentelė

Klasė	Mažiausias skersmuo, išmatuotas atžalos viduryje (mm)	Mažiausias aukštis (m)
N1	6	1,5
N2	15	3,0

